

BIENVENIDOS AL Laboratorio de Botánica

FACULTAD DE AGRONOMIA | UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Erianthus angustifolius | POACEAE (GRAMINEAE) - tribu ANDROPOGONEAE

Hábito: hierbas perennes, cespitosas, erectas, hasta 1,65 m de alto, de nudos glabros o con escasos pelos. **Hojas:** linear-lanceoladas; vainas pubescentes, glabras hacia la base; lígulas truncadas o triangulares, ápice obtuso, glabras o pubescentes; láminas glabras, rígidas, ápice agudo, nervio medio grueso. **Inflorescencia:** panícula terminal, hasta 25 cm largo. **Espiguillas:** una sésil y la otra pedicelada; pedicelo con pelos largos y sedosos. **Fruto:** cariopsis de 2,2 a 3 mm de largo, rugosa.

Fenología: florece desde enero a febrero, sazona de febrero a marzo.

Distribución: Brasil meridional, Paraguay, Bolivia, Uruguay y norte-centro de la Argentina.

Ambiente: en campos, preferentemente húmedos o arenosos, o en terrenos inundables.

Nombre común: paja estrelladora

a: habitat, aspecto del pajonal en estado avanzado de floración;

b: detalle de la inflorescencia;

c: hábito;

d: nótese la proporción de la costilla media con respecto al ancho de la hoja en

E. angustifolius (izq.) comparada con la de *E. trinii* (der.);

e: : ápice de la hoja, nótese el afinamiento gradual en *E. angustifolius* (izq.) comparada con el más abrupto de *E. trinii* (der.)

